

## Dávkovanie a aplikácia podľa plodín:

- Obilniny:** Dávka za vegetačné obdobie: 5,0 l.ha<sup>-1</sup>  
1. dávka 3,0 l.ha<sup>-1</sup> počas intenzívneho rastu  
2. dávka 2,0 l.ha<sup>-1</sup> na začiatku klasenia
- Kukurica:** Dávka za vegetačné obdobie: 7,0 - 9,0 l.ha<sup>-1</sup>  
1. dávka 3,0-5,0 l.ha<sup>-1</sup> v 6. - 7. týždni po vzídení  
2. dávka 2,0 l.ha<sup>-1</sup> v 10.-12. týždni po vzídení  
3. dávka 2,0 l.ha<sup>-1</sup> na začiatku kvitnutia
- Cukrová repa:** Podľa kvality pôdy trikrát za vegetačné obdobie vždy v množstve 3,0-4,0 l.ha<sup>-1</sup>  
1. dávka v období 4. - 6. listu  
2. dávka v období uzatvárania riadkov  
3. dávka v mesiaci august
- Slničnica:** Trikrát za vegetačné obdobie v celkovej dávke 8,0 l  
1. dávka v období 4. až 8. páru listov v množstve 2,0 l.ha<sup>-1</sup>  
2. dávka v období od 8. páru listov do začiatku kvitnutia v množstve 4,0 l.ha<sup>-1</sup>  
3. dávka v období od zelenožltého do hnedožltého zafarbenia kvetiného disku v množstve 2,0 l.ha<sup>-1</sup>
- Zemiaky:** Dávka za vegetačné obdobie je 14,0 l.ha<sup>-1</sup>  
1. dávka v dobe intenzívneho rastu v množstve 3,0 l.ha<sup>-1</sup>  
2. dávka na začiatku tvorby hl'úz v množstve 4,0 l.ha<sup>-1</sup>  
3. dávka v období kvitnutia v množstve 4,0 l.ha<sup>-1</sup>  
4. dávka v období rastu plodov (bobúľ) v množstve 3,0 l.ha<sup>-1</sup>
- Polná a rýchlená zelenina:**
- Pestovanie priesad:** Polievať trikrát za týždeň 0.2% roztokom, alebo raz za týždeň 1.0% roztokom.
- Výsev na stále stanovište:** Aplikuje sa 4 krát za vegetačné obdobie postrekom vždy v množstve 2,0 - 5,0 l.ha<sup>-1</sup>  
- 2 krát v období intenzívneho rastu  
- 1 krát v období začiatku kvitnutia  
- 1 krát v období tvorby a rastu plodov
- Pestovanie vo fóliovníkoch a skleníkoch:**  
Dávka za vegetačné obdobie je 2,0 - 2,41.1000m<sup>2</sup>  
- 6 až 8 dní po vysadení priesad v množstve 0,5 - 0,61.1000m<sup>2</sup>  
- počas aktívneho rastu v množstve 0,5 - 0,61.1000m<sup>2</sup>  
- na začiatku kvitnutia v množstve 0,5 - 0,6 1.1000m<sup>2</sup>  
- počas tvorby plodov v množstve 0,5 - 0,61.1000m<sup>2</sup>
- Ovocné dreviny:**
- Kôstkoviny:** Odporúčaná dávka je 15,0 - 20,01 hnojiva.ha<sup>-1</sup> za vegetačné obdobie vo forme vodného roztoku.  
**Bobuľoviny:** Odporúča sa na hnojenie ríbezlí, egrešov, jahôd a malín. Používa sa v období intenzívneho rastu výhonkov trikrát a v dobe kvitnutia dva krát, vždy v množstve 2,0 - 3,0 l.ha<sup>-1</sup>. Celková dávka za vegetačné obdobie je 10,0-15,01.ha<sup>-1</sup>.
- Jadroviny:** Používa sa najmä pri pestovaní jabloní. Dávka za vegetačné obdobie je 16,0 - 20,0 l.ha<sup>-1</sup>. V prípade nebezpečia nástupu chorôb sa môže dávka zvýšiť na 25,0 - 28,0 l.ha<sup>-1</sup>. Ročnú dávku je potrebné rozdeliť na 4 - 5 hnojení, pričom prvé hnojenie sa uskutoční hneď po rozpuku.
- Vinohrady:** Dávka za vegetačné obdobie je 25,0 l.ha<sup>-1</sup>  
1. dávka sa aplikuje v čase rozpuku v množstve 3,0 l.ha<sup>-1</sup>  
2.. 3. a 4. dávka v čase rastu výžhonkov (5 -10 cm, 20 - 30 cm, 40 - 60 cm) v množstve 4,0 l.ha<sup>-1</sup>  
5. dávka v čase tvorby bobúľ v množstve 3,0 l.ha<sup>-1</sup>  
6. dávka v čase intenzívneho rastu bobúľ v množstve 4,0 l.ha<sup>-1</sup>  
7. dávka v čase dozrievania bobúľ v množstve 3,0 l.ha<sup>-1</sup>. Tento postrek podporí dozrievanie a odolnosť voči mrazu.

**Všetky plodiny ošetrte vodným roztokom hnojiva za použitia minimálne 200 litrov vody na hektár.**